AKTUELLE IMPFEMPFEHLUNGEN DER STIKO (STÄNDIGE IMPFKOMMISSION)

(vereinfachte Darstellung; Stand: August 2023*)

NaLI Nationale Lenkungsgruppe Impfen
www.nali-impfen.de

WANN?	WOGEGEN?	WIE OFT?
SÄUGLINGE/KLEINKINDER		
6 Wochen	Rotaviren	2 oder 3 Schluckimpfungen (je nach verwendetem Impfstoff) im Abstand von 4 Wochen
2 Monate	Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie, Kinderlähmung (Poliomyelitis), Hib-Gehirnhautentzündung, Keuchhusten (Pertussis), Hepatitis B und Pneumokokken (u.a. Sepsis)	3 Kombi-Impfungen (Sechsfachimpfstoff) und 3 Pneumokokkenimpfungen
4 Monate		
11 Monate		
11 Monate (sollte das Kind früher eine KITA besuchen: ab 9 Monate)	Masern Mumps Röteln Windpocken (Varizellen)	1. Impfung Masern-Mumps-Röteln-Kombiimpfstoff (MMR) und 1 Varizellenimpfung
15 Monate		2. Impfung MMRV-Kombiimpfstoff
12 Monate	Meningokokken C (Gehirnhautentzündung/Sepsis)	1 Impfung
KINDER/JUGENDLICHE		
5 bis 6 Jahre	Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten	1. Auffrischimpfung (Kombiimpfstoff)
9 bis 16 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten UND Kinderlähmung	2. Auffrischimpfung (Kombiimpfstoff)
9 bis 14 Jahre	HPV (Humane Papillomviren), u.a. Gebärmutterhalskrebs und -vorstufen, Peniskarzinom, Genitalwarzen	2 Impfungen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Impfbeginn ab Alter >14 Jahre 3 Impfungen
Bei fehlenden Impfungen: Nachholimpfungen bis zum 18. Geburtstag	u.a. Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, HPV, Meningokokken C, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (falls nicht durchgemacht)	abhängig von Vorimpfungen (von Kassen bis zum 18. Geburtstag erstattet)
ERWACHSENE		
Ab 18 Jahren	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten[1], ggf. Kinderlähmung (falls Impfung fehlt)	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
	COVID-19	Basisimmunität aus 3 Antigenkontakten (ggf. auch Infektion, jedoch mind. 2 Impfungen), Impfung auch in der Schwangerschaft möglich
Ab 18 bis ca. 50 Jahre (alle nach 1970 Geborene)	Masern (bei fehlender Impfung)	1 Impfung (MMR-Kombiimpfstoff) 2 Impfungen bei erhöhtem beruflichen Risiko (z.B. Tätigkeit in med. Einrichtungen oder Gemeinschaftseinrichtung)
Frauen im gebärfähigen Alter	Röteln und Windpocken (ergänzend zum o.g. Impfschutz für Erwachsene)	Prüfung auf Vollschutz und ggf. Nachimpfung: 2 Rötelnimpfungen (falls fehlend) und 2 Windpocken-impfungen (falls keine Antikörper)
Personen mit Kontakt zu Neugeborenen (z.B. Partner, Großeltern, Babysitter)	Keuchhusten (Auffrischimpfung)	Keuchhustenimpfung alle 10 Jahre (als Kombi mit Tetanus, Diphtherie)
Schwangere	Grippe (Influenza)	1 Impfung ab 2. Schwangerschaftsdrittel
	Keuchhusten	1 Impfung zu Beginn des 3. Schwangerschaftsdrittels
ERWACHSENE AB 60		
Ab 60 Jahren	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten[1], ggf. Kinderlähmung (falls Impfung fehlt)	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
	Grippe (Influenza)	1 Impfung jedes Jahr im Herbst
	COVID-19	Basisimmunität und 1 Auffrischimpfung jedes Jahr (vorzugsweise im Herbst)
	Pneumokokken (Lungenentzündung)	1 Impfung (bei Risikogruppen ggf. weitere Impfungen)
	Gürtelrose (Herpes zoster)	2 Impfungen (Totimpfstoff) im Abstand von mind. 2 bis max. 6 Monaten (bei Risikogruppen ab 50 Jahren)
ALLE ALTERSGRUPPEN		
ALLEN Zeckenexponierten in FSME-Risikogebieten	FSME (Frühsommermeningo-enzephalitis), von Zecken übertragen	3 Impfungen, 1 Auffrischimpfung alle 3 bzw. 5 Jahre

[1] nur mit nächstfälliger Tetanus-/Diphtherie-Impfung | * vollständige Empfehlung der STIKO: www.stiko.de