

# AKTUELLE IMPFEMPFEHLUNGEN DER STIKO (STÄNDIGE IMPFKOMMISSION)

(vereinfachte Darstellung; Stand: März 2019\*)



WANN?	WOGEGEN?	WIE OFT?
<b>SÄUGLINGS/KLEINKINDER</b>		
6 Wochen	Rotaviren	2 oder 3 Schluckimpfungen (je nach verwendetem Impfstoff)
2 Monate	Wundstarrkrampf (Tetanus) Diphtherie	z.B.: 4 Kombi-Impfungen (Sechsfachimpfstoff) und 3 Pneumokokken-Impfungen
3 Monate	Kinderlähmung (Poliomyelitis) Hib-Gehirnhautentzündung	
4 Monate	Keuchhusten (Pertussis) Hepatitis B und	
11 bis 14 Monate	Pneumokokken-Erkrankung	
11 bis 14 Monate	Masern Mumps	1. Impfung Masern-Mumps-Röteln-Kombi-Impfstoff (MMR) und 1 Varizellen-Impfung
15 bis 23 Monate	Röteln Windpocken	2. Impfung MMRV-Kombi-Impfstoff
12 bis 23 Monate	Meningokokken C (Gehirnhautentzündung/Sepsis)	1 Impfung
<b>KINDER/JUGENDLICHE</b>		
5 bis 6 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten	1. Auffrischimpfung (Kombi-Impfstoff)
9 bis 16 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten UND Kinderlähmung	2. Auffrischimpfung (Kombi-Impfstoff)
9 bis 14 Jahre	HPV (Humane Papillomaviren), u.a. Gebärmutterhalskrebs, Peniskarzinom und - vorstufen, Genitalwarzen	2 Impfungen ( <b>auch für Jungen seit 2018 empfohlen</b> )
<b>Bei fehlenden Impfungen: Nachholimpfungen</b> bis zum 18. Geburtstag	u.a. Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, HPV, Meningokokken C, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (falls nicht durchgemacht)	abhängig von Vorimpfungen
<b>ERWACHSENE</b>		
Ab 18 Jahren	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten <sup>1</sup> ggf. Kinderlähmung (falls Impfung fehlt)	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
Ab 18 bis ca. 49 Jahre (alle nach 1970 Geborene, bei fehlender, unbekannter oder nur 1x Impfung in Kindheit)	Masern	1 Impfung (MMR-Kombi-Impfstoff)
<b>Frauen im gebärfähigen Alter</b> (bei fehlenden Impfungen)	u.a. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und Keuchhusten	u.a. Nachweis von mind. 2 Impfungen gegen Röteln; Keuchhusten-Impfung innerhalb der letzten 10 Jahre
<b>Schwangere</b>	Grippe (Influenza)	1 Impfung ab 2. Schwangerschaftsdrittel
<b>ERWACHSENE AB 60</b>		
Ab 60 Jahren	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten <sup>1</sup>	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
	Grippe (Influenza)	1 Impfung jedes Jahr im Herbst
	Pneumokokken (Lungenentzündung)	1 Impfung
	Herpes Zoster (Gürtelrose)	2 Impfungen (Totimpfstoff) im Abstand von mind. 2 bis max. 6 Monaten
<b>ALLE ALTERSGRUPPEN</b>		
<b>Aufenthalt in Risikogebieten</b>	FSME (Frühsommermeningoenzephalitis), von Zecken übertragen	3 Impfungen Auffrischimpfung alle 3 bzw. 5 Jahre

<sup>1</sup> nur mit nächstfälliger Tetanus-/Diphtherie-Impfung | \* vollständige Empfehlung der STIKO: [www.stiko.de](http://www.stiko.de), Informationen: [www.impfen-info.de](http://www.impfen-info.de)