

# AKTUELLE IMPFEMPFEHLUNGEN DER STIKO (STÄNDIGE IMPFKOMMISSION)

(vereinfachte Darstellung; Stand: Mai 2021\*)

WANN?	WOGEGEN?	WIE OFT?
<b>SÄUGLINGE/KLEINKINDER</b>		
<b>6 Wochen</b>	Rotaviren	2 oder 3 Schluckimpfungen (je nach verwendetem Impfstoff) im Abstand von 4 Wochen
<b>2 Monate</b>	Wundstarrkrampf (Tetanus), Diphtherie, Kinderlähmung (Poliomyelitis), Hib-Gehirnhautentzündung, Keuchhusten (Pertussis), Hepatitis B und Pneumokokken (u.a. Sepsis)	3 Kombi-Impfungen (Sechsfachimpfstoff) und 3 Pneumokokkenimpfungen
<b>4 Monate</b>		
<b>11 Monate</b>		
<b>11 Monate</b> (sollte das Kind früher eine KITA besuchen: ab 9 Monate)	Masern Mumps Röteln	1. Impfung Masern-Mumps-Röteln-Kombiimpfstoff (MMR) und 1 Varizellenimpfung
<b>15 Monate</b>	Windpocken (Varizellen)	2. Impfung MMRV-Kombiimpfstoff
<b>12 Monate</b>	Meningokokken C (Gehirnhautentzündung/Sepsis)	1 Impfung
<b>KINDER/JUGENDLICHE</b>		
<b>5 bis 6 Jahre</b>	Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten	1. Auffrischimpfung (Kombiimpfstoff)
<b>9 bis 16 Jahre</b>	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten UND Kinderlähmung	2. Auffrischimpfung (Kombiimpfstoff)
<b>9 bis 14 Jahre</b>	HPV (Humane Papillomviren), u.a. Gebärmutterhalskrebs und -vorstufen, Peniskarzinom, Genitalwarzen	2 Impfungen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Impfbeginn ab Alter >14 Jahre 3 Impfungen
<b>Bei fehlenden Impfungen: Nachholimpfungen bis zum 18. Geburtstag</b>	u.a. Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, HPV, Meningokokken C, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (falls nicht durchgeführt)	abhängig von Vorimpfungen (von Kassen bis zum 18. Geburtstag erstattet)
<b>ERWACHSENE</b>		
<b>Ab 18 Jahren</b>	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten <sup>1</sup> , ggf. Kinderlähmung (falls Impfung fehlt)	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
<b>Ab 18 bis ca. 50 Jahre (alle nach 1970 Geborene)</b>	Masern (bei fehlender Impfung)	1 Impfung (MMR-Kombiimpfstoff) 2 Impfungen bei erhöhtem beruflichen Risiko (z.B. Tätigkeit in med. Einrichtungen oder Gemeinschaftseinrichtung)
<b>Frauen im gebärfähigen Alter</b>	Röteln und Windpocken (ergänzend zum o.g. Impfschutz für Erwachsene)	Prüfung auf Vollschutz und ggf. Nachimpfung: 2 Rötelnimpfungen (falls fehlend) und 2 Windpockenimpfungen (falls keine Antikörper)
<b>Personen mit Kontakt zu Neugeborenen (z.B. Partner, Großeltern, Babysitter)</b>	Keuchhusten (Auffrischimpfung)	Keuchhustenimpfung alle 10 Jahre (als Kombi mit Tetanus, Diphtherie)
<b>Schwangere</b>	Grippe (Influenza)	1 Impfung ab 2. Schwangerschaftsdrittel
	Keuchhusten (Pertussis)	1 Impfung zu Beginn des 3. Schwangerschaftsdrittels
<b>ERWACHSENE AB 60</b>		
<b>Ab 60 Jahren</b>	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten <sup>1</sup> , ggf. Kinderlähmung (falls Impfung fehlt)	1 Auffrischimpfung alle 10 Jahre
	Grippe (Influenza)	1 Impfung jedes Jahr im Herbst
	Pneumokokken (Lungenentzündung)	1 Impfung (bei Risikogruppen ggf. weitere Impfungen)
	Gürtelrose (Herpes zoster)	2 Impfungen (Totimpfstoff) im Abstand von mind. 2 bis max. 6 Monaten (bei Risikogruppen ab 50 Jahren)
<b>ALLE ALTERSGRUPPEN</b>		
<b>Impfung gegen COVID-19:</b>	gemäß den jeweils aktuellen STIKO-Empfehlungen; Anzahl der Impfungen und deren Abstand ist abhängig vom jeweiligen Impfstoff	
<b>ALLE mit Aufenthalt in FSME-Risikogebieten (<a href="#">Link</a>)</b>	FSME (Frühsommermeningoenzephalitis), von Zecken übertragen	3 Impfungen, 1 Auffrischimpfung alle 3 bzw. 5 Jahre

<sup>1</sup> nur mit nächstfälliger Tetanus-/Diphtherie-Impfung | \* vollständige Empfehlung der STIKO: [www.stiko.de](http://www.stiko.de)